

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



LORRAINE

Bulletin n° 22 du 3 octobre 1996

GRANDES CULTURES

Colza

Les colzas sont entre les stades cotylédons et 4 feuilles. Leur développement est freiné par l'absence prolongée de précipitations. Les altises restent discrètes ; quelques morsures sont visibles, mais les seuils d'intervention ne sont généralement pas dépassés.

Charançon du bourgeon terminal

Les premiers charançons ont été piégés le 3 octobre dans les secteurs de Haroué (54), de Silly-en-Saulnois et Ottange (57).

Nous vous rappelons que seule une cuvette jaune vous permet de repérer l'arrivée exacte des charançons dans VOTRE parcelle. Les traitements doivent intervenir 8 à 10 jours après les premières captures, soit vers la mi-octobre dans les secteurs cités plus haut.

Tenthrede de la rave (Athalia rosae)

Des adultes ont été capturés dans les cuvettes jaunes. Surveiller régulièrement vos parcelles. Les larves ou fausses chenilles sont de couleur gris foncé à noire, avec une bande gris-vertâtre sur les côtes. Elles peuvent occasionner de gros dégâts, dévorant les feuilles en peu de jours.

Dès le repérage d'un nombre de larves important, intervenir très rapidement avec une pyrèthrine (Talstar, Cymbusch, Décis, Karaté, Galion).

Désherbage anti-graminées

Lorsqu'elles sont nombreuses, les graminées exercent une forte concurrence vis-à-vis du colza. Cette concurrence, en eau notamment, est d'autant plus grave que les sols n'ont que très peu de réserves disponibles actuellement. Ces repousses peuvent également servir de réservoir aux pucerons qui migreront vers les jeunes céréales avoisinantes dès leur levée, transportant avec eux le virus de la jaunisse nanisante.

Les anti-graminées habituels s'utilisent à partir du stade 2-3 feuilles des graminées, quel que soit le stade du colza.

Rattrapage anti-dicotylédones

Du fait des conditions particulièrement sèches, certains désherbages ont pu être inefficaces. Quelques solutions sont encore possibles, à condition d'intervenir le plus souvent sur des adventices encore jeunes.

- *Chrono* : après le stade 6 feuilles du colza. A une bonne efficacité sur géranium disséqué et gaillet.

- *Cent 7* : sur colzas dépassant le stade 5-6 feuilles, après les premiers froids (cuticule cireuse bien développée) en fin d'automne. Il contrôle assez bien les sanves et ravenelles.

- *Lontrel 100 ou Lontryx 200* : à utiliser sur adventices bien développées, par températures supérieures à 10°, en l'absence de pluie pendant 4 heures minimum. Est efficace sur matricaires, chardons, bleuets, faux persil,...

- *Pradone TS* : attendre que les colzas soient bien développés (cuticule cireuse bien enracinée). Est efficace sur dicotylédones jeunes (gaillet, lamier, mouron, myosotis, pensée, véronique,...).

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51



Colza : Début du vol de charançon du bourgeon terminal.

Céréales : Surveiller les limaces et les pucerons.

Moisson d'automne : Du 28 octobre au 4 novembre.



4° 30
50 614

03

ABONNEMENT ANNUEL 350 F

Limaces

Elles sont toujours absentes sous les pièges. Il faut cependant rester vigilant, surtout après la période pluvieuse du 30 septembre.

Vérifier la présence de dégâts dans les colzas et surveiller tout particulièrement les céréales non encore levées. Intervenir dès les premiers piégeages.

Céréales

De nombreuses parcelles sont semées et devraient lever rapidement dans les prochains jours.

Pucerons

Commencer à surveiller les pucerons dès la sortie de la première feuille. Des observations commenceront dès cette semaine et les résultats vous seront communiqués dans notre prochain bulletin.

Désherbage

Le sol trop sec n'a pas permis d'appliquer les produits de pré-levée. Choisir un herbicide de post-levée adapté à la flore présente, en respectant les stades d'intervention. En général, la majorité des produits mixtes visant graminées et dicotylédones sont utilisables à partir du stade 2 à 3 feuilles des blés ou orges. Quelques exceptions cependant et notamment Défi (prosulfocarbe), utilisable sans interruption dès le semis jusqu'au stade 2-3 feuilles des céréales.

Moisson d'automne : du 28 octobre au 4 novembre 1996

Moisson d'automne : le temps de la collecte des pesticides

Le S.R.P.V., étroitement associé à l'opération de récupération des Produits Phytosanitaires Non Utilisés (PPNU) vous rappelle :

Que du 28 octobre au 4 novembre vous pourrez déposer vos PPNU auprès de votre coopérative ou de votre négociant.

Prenez rapidement contact avec lui. Il vous donnera toutes les informations nécessaires au déroulement de cette action.

Cette opération est unique et totalement gratuite.

PHYTOMA - La Défense des Végétaux BULLETIN D'ABONNEMENT SPÉCIAL réservé aux abonnés aux Avertissements Agricoles

M., Mme, Sté :
Adresse :
Code postal : Ville :

☐ souscrit un abonnement d'un an
(11 numéros + Cahiers de "PHYTOMA - La Défense des Végétaux")
au tarif exceptionnel de 280 F au lieu de ~~350~~ F

à retourner au Service Abonnement "Phytoma - La Défense des Végétaux" :
78 rue de la Condamine - 75017 PARIS - Tél. : 01 44 90 70 41

Offre valable jusqu'au 31 décembre 1996

AVA2 96